



Klinika ARVET

- komplexní péče o malá zvířata -

Vrcovická 2227, 39701 Písek, tel.: 382 215 038, mobil: 603 496 589_

KRMENÍ ELIMINAČNÍ DIETOU

1. Dieta sestává pouze z jednoho sacharidového (karbohydrátového) zdroje plus vody. Nepoužívejte k vaření masa máslo ani margariny, žádné koření kromě malého množství soli. Z masa odstraňte přebytečný tuk. Nejvhodnější příprava masa je vaření. K vařené rýži nebo bramborám lze přidat vývar z připravovaného masa. Poměr masa ku bramborám nebo rýži by měl být 1:3. K dietě lze přidat syntetické vitamíny (Spofavit) a lžičku slunečnicového oleje.

V případě, že krmíte kompletní granulovanou hypoalergenní dietu, není třeba přidávat žádné vitamíny.

2. Nejčastěji používané diety jsou: Jako zdroj bílkoviny jehněčí, králík, krůta, ryba, jako zdroj škrobu (sacharidů) brambory nebo rýže.
3. Dietu je nutno podávat po dobu 6-8 týdnů.
4. Pokud chcete podávat pacientovi jakékoli pamlsky, lze použít pouze kousek masa, které je obsaženo v hypoalergenní dietě, příp. brambory, neochucené hranolky.
5. Informujte celou domácnost o nezbytnosti dodržení diety!
6. Vaše zvíře se po dobu diety nesmí dostat k žádnému jinému zdroji krmiva nebo k odpadkům.
7. Pokud jdete na procházku, pes musí být stále na vodítku (zabráňte tím sbírání kousků jídla při venčení).
8. Pamatujte!!! Pokud vaše zvíře pozře cokoli jiného než dietu, vystavujete se riziku, že získáme zkreslené výsledky a nemusíme diagnostikovat tím pádem příčinu onemocnění. Veškerý čas a prostředky jsou pak investovány zbytečně.
9. Za 6-9 týdnů (neurčí-li ošetřující lékař jinak) nás kontaktujte. Tuto dietu nelze krmit celoživotně- nejedná se o vyváženou stravu!!
10. Všimněte si příznaků svědění u zvířete. Měřte svědivost na stupnici od jedné k desíti, s tím, že desítka je stupeň před nasazením hypoalergenní diety. Všimněte si též lokalizace svědivosti.
11. Někdy se stane, že pacient nechce hypoalergenní dietu přijmát (zejména kočky). I přesto vytrvejte s podáváním diety. Většina pacientů za několik málo dní začne krmivo přijímat. Nutná je opatrnost u obtlouklých koček, které z hlediskam možných komplikací při déletrvající hladovce nelze nechat hladovět déle než 2-3 dny.
12. Pokud se u pacienta objeví řídká stolice, zvyšte množství rýže nebo brambor (podle toho co podáváte). Velmi zřídka může přechodně dojít též ke zvracení.

